

המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

מחלקת אף, אוזן וגרון

דף הסבר לקראת ואחרי ניתוח הכנסת צינוריות אוורור

מטופל יקר,

אתה מועמד לעבור ניתוח זה במחלקתנו.

לפני הניתוח:

- תתבקש לבצע בדיקות דם ולפי הצורך גם צילום חזה ואק"ג.
- תתבקש להביא שתי בדיקות שמיעה.
- אם קיימות מחלות רקע יתכן שתתבקש להביא אישורים רפואיים נוספים, כגון אישור קרדיולוג.
- את המסמכים הרפואיים האלו תתבקש להעביר למרפאתנו (ישירות או בפקס) בהקדם האפשרי, לפני המועד שנקבע לך לביקור במרפאה הטרומ ניתוחית.

במרפאה הטרומ ניתוחית:

- כשבוע טרם המועד המשוער של הניתוח תוזמן למרפאה טרום ניתוחית.
- במרפאה תיבדק ע"י רופא מרדים שישוחח עימך ויסביר לגבי ההרדמה.
- תשוחח עם אחות ותקבל הדרכה נוספת.
- רופא המחלקה יסקור את תיקך הרפואי ואת הבדיקות שהתבקשת לבצע וייתן אישור סופי לניתוח.
- יום לאחר הבדיקה הטרומ ניתוחית נתאם עימך בטלפון את המועד הסופי של הניתוח.

ביום קבלתך למחלקה עליך להביא עמך:

- טופס 17 לאשפוז.
- רשימת תרופות שהנך נוטל באופן קבוע.
- בדיקות, מסמכים וצילומי רנטגן או תקליטורים שהתבקשת להביא.

ערב הניתוח:

- מותרת לך כלכלה רגילה.
 - עליך להיות בצום מוחלט (גם לא לשתות) מהשעה 24:00.
- בוקר הניתוח:

- תרד/י לחדר ניתוח על מיטתך.
- לאחר הניתוח תשהה בחדר ההתאוששות מס' שעות.
- חזרתך למחלקה תהיה לקראת הצהריים.
- כעבור שעותיים מותרת לך שתייה קרה בהדרגה, וארוחת ערב קלה.
- השחרור מהמחלקה הוא בד"כ בשעות אחר הצהריים ביום הניתוח.
- אם יש כאבים, ניתן לקבל תרופה להרגעת הכאב לפי הצורך.

מהלך הניתוח ולאחריו :

- הניתוח יתבצע בהרדמה כללית או מקומית.
- במהלך הניתוח המנתח ינקה את תעלת האוזן במידת הצורך, יעריך את מצב התופית ונוכחות נוזלים באוזן התיכונה.
- יתבצע חתך זעיר בתופית, דרכו תוחדר צינורית האוורור.

תופעות לוואי או סיבוכים אפשריים :

- יתכנו כאבים קלים באוזן.
- תיתכן הפרשה נוזלית ולעיתים דמית.

הנחיות להתנהגותך בבית :

- להימנע באופן מוחלט מחדירת מים לאוזן, וזאת ע"י אטמי סיליקון, או ע"י ציג טבול בוזלין בשעת המקלחת. לאחר הרחצה יש להוציא את האטם מהאוזן ולהניח לה להתאוורר.
- בכאבים יש לטפל באופן נדיב בתרופות נוגדות כאבים כמו אקמול או אופטלגין. יש להימנע מטיפול בתרופות מקבוצת ה- NSAIDS כגון נורופן או אדוויל עקב סיכון מוגבר לדימום.
- לטפטף טיפות אוזניים ככתוב במכתב השחרור.
- הצינוריות נפלטות מהאוזן בד"כ בתוך כשנה עד שנה וחצי. במהלך תקופה זו יש להיות במעקב בקופ"ח.
- לאחר פליטת הצינורית הנקב בד"כ ייסגר מעצמו. ניתן להרטיב את האוזן רק לאחר שהנקב נצפה סגור ע"י רופא.
- במידה והצינוריות לא נפלטו לאחר כשנה וחצי יש להיבדק ע"י רופא אא"ג שישקול צורך בהוצאת הצינורית.

נשמח לעזור אם תתעוררנה שאלות נוספות בטלפון מס': 03-5028656/7

החלמה מהירה ושהות נעימה במחלקתנו