



רופאי היחידה: ד"ר צילי צנגן, ד"ר דרור וינר, ד"ר איציק בר-אור
אחות היחידה: רחל אביב
דיאטניות: ענת לוי, ליה לוי
יחידת מחקר-דיאטניות PIDB:
רותם סגל-בונה, מיכל יעקב, חן סרבגילי, לי אברמס



חיסונים ומחלת מעי דלקתית (IBD):

רקע:

חיסונים ניתנים לכל הילדים לפי לוח חיסוני השיגרה (לוח חיסוני השגרה בישראל). מטרתנו היא רק לבדוק שכלל המטופלים מחוסנים בחיסונים אלה. לכן שתי סיבות, הראשונה ברורה, ההגנה אותם הם נותנים בפני המזהמים השונים. השניה, חלק מהחיסונים הם חיסונים חיים. אתם אסור לקבל בזמן טיפול המדכא את פעילות מערכת החיסון. חלק ממטופלנו יזדקקו לטיפול שעלול לדכא את פעילות מערכת החיסון, לכן נמליץ לפני התחלת טיפול זה לברר את הסטטוס החיסוני של המטופל. במידה ויש צורך נשלח את החיסונים הנדרשים לפני תחילת הטיפול.

✓ קיימים שני סוגים עיקריים של חיסונים - חיסונים מומתים וחיסונים חיים (מוחלשים).

חיסונים מומתים – רוב חיסוני השגרה בישראל נכללים בקבוצה זו. אלה חיסונים שמכילים בדרך כלל חלקיקים (חלבונים שונים) כלומר אין בהם מזהם חי שעלול לגרום למחלה. קבוצת החיסונים המומתים בטוחה לשימוש במטופלים עם מערכת חיסונית מדוכאת. אנו בכל זאת נמליץ לכל מטופל במידה ולא חוסן להשלים את החיסוני השגרה כבר באבחנה כדי לאפשר תגובה מיטבית לחיסון, ובמידה ונתחיל טיפול תרופתי המדכא את מערכת החיסון לא יהיה עיכוב נוסף.

חיסונים מומתים הנמצאים בשימוש בשיגרת החיסונים:

- שפעת עונתית בוריקה בלבד (שימו לב- לא בתרסיס לאף! זה החיסון החי) – מגיל חצי שנה שתי מנות, ובהמשך מנה אחת לשנה
- דלקת ריאות (Pneumococcus - Prevenar) ניתן בשלוש מנות, גיל חודשיים, ארבע חודשים ובגיל שנה
- דלקת כבד נגיפית מסוג A (Hepatitis A) - בגיל 18 ו 24 חודשים
- דלקת כבד נגיפית מסוג B (Hepatitis B) - ניתן בלידה, בגיל חודש ובגיל חצי שנה
- טטנוס, דיפטריה, שעלת (חיסון המשולש - DTaP) + שיתוק ילדים (פוליו) בוריקה בלבד (החיסון בטיפות הוא חיסון חי) + המופילוס אינפלאוזה (HIB) – ניתן בגיל חודשיים, ארבע חודשים, שישה חודשים בטיפות (חיסון חי), בגילה שנה ושבו בטיפות בגיל שנה וחצי, ל DTaP יש נמחה דחף בכיתה ב' + מנת דחף של חיסון הפוליו, ומנת דחף נוספת בכיתה ח' ללא פוליו
- דלקת קרום המוח (Meningococcus) שאינו בשגרת חיסוני הילדות בישראל
- נגיף הפפילומה נגד סרטן צוואר הרחם (HPV) - ניתן בשתי מנות בכיתה ח'

חיסונים חיים (מוחלשים) - חיסונים אלה מורכבים מנגיף או חיידק חי מוחלש שעלול לגרום למחלה באופן מוחלש ובכך להתפתחות החיסון. עבור אדם עם מערכת חיסונית מדוכאת עלול לפתח תסמיני מחלה קשה יותר, לכן אין להסן בחיסון חי בזמן טיפול מדכא חיסון.

חיסונים חיים (מוחלשים):

- חצבת-חורת-אדמת (MMR) – ניתן בגיל שנה ובכיתה א'
- אבעבועות רוח (Varicella) - ניתן בגיל שנה ובכיתה א'
- שפעת בתרסיס לאף (FluMist)
- רוטה וירוס (Rotavirus) – ניתן בשלוש מנות בגיל חודשיים, ארבע ושישה חודשים
- שיתוק ילדים (פוליו) בטיפות דרך הפה – ניתן שתי מנות בגיל שנה וחצי ושנתיים
- קדחת צהובה (Yellow Fever) - חיסון נגד מחלה שאינה קיימת בארצנו. ניתן בדרך כלל רק למטיילים לאזורים נגועים.
- טיפואידי (Oral Typhoid) בטיפות דרך הפה. לא קיים בארץ. ניתן בדרך כלל רק למטיילים לאזורים נגועים.

יש להמתין 3 שבועות לאחר קבלת חיסון חי, לפני טיפול מדכא של מערכת החיסון!
במידה ומטופל צריך לקבל חיסון חי, יש להפסיק את הטיפול מדכא החיסון ולהמתין 3 חודשים לפני שניתן לקבל את החיסון!



המלצות:

1. מומלץ שכל בני הבית התחננו, כדי שלא תשמשו מקור לזיהומים.
2. בחיסון לאבעבועות רוח (Varicella) כ-5% מהמתחסנים עלולים לפתח פריחה. במקרה זה, יש למנוע מגע בין הילד מדוכא החיסון לבין האדם המחוסן עד הופעת גלד בכל הנגעים, בשלב זה הפריחה אינה מדבק יותר.
3. חיסון הרוטה וירוס, קיימים עדויות בהם נמצאו וירוסים חיים בצואה של המחוסנים ולכן יש לשמור על היגיינת הידיים אצל בני בית שקיבלו את חיסון, הרצה טובה של הידיים במקרה של החלפת חיתול לתינוק על ידי אחד מבני המשפחה והשמחה והטיפול לא יתחיל את התינוק שחוסן למשך 14 יום.
4. מומלץ שלא לחסן בני משפחה של מדוכא חיסון בחיסון חי נגד פוליו (הניתן בטיפות דרך הפה).



WEB

ת.ד. 5, חולון 5810001 | POB 5, Holon 5810001



בברכה ובריאות שלמה, צוות המכון לגסטרואנטרולוגיה ילדים
בכל שאלה ניתן להתייעץ בטלפון 03-5028838



Facebook