


13.32x13.99	1	עמוד 75	י תד נאמן - כותרת	20/09/2016	55206802-8
בית חולים וולפסון - 20160					

רפואה

בעריכת: נ. קצין

המטלוג בכיר בוולפסון:

רופאים נמנעים ממתן תרופות מחשש לדימום



רופאים רבים חוששים לתת טיפול מתמשך בתרופות, בשל פחד לא מוצדק מדימום. כך התריע ד"ר אשר וינדר, מנהל המכון להמטולוגיה ב"וולפסון", בכנס סל הבריאות 2017 שהתקיים בתל אביב.

ד"ר וינדר, מבכירי ההמטולוגים בארץ ומי שמוכר כמומחה מוביל בתחום הקרישה, הדגיש את החשיבות הרבה של התרופות החדשות מקבוצת נוגדי קרישה (אנטיקואגולנטים). הוא הסביר כי במצבים כמו פקקת (תרומבוז) בוורידי הרגליים, יש צורך בטיפול בתרופות נוגדות קרישה כדי למנוע פקקת חוזרת ולמנוע שהקריש ישוט עם זרם הדם ויגיע אל הראות. מצב זה מכונה תסחיף ריאתי, ועלול לגרום למוות.

כי במהלך השנים האחרונות פותחו תרופות יעילות, אשר גורמות לפחות דימומים. השימוש בתרופות יאפשר לתת לחולים את הטיפול כפי שנדרש.

ד"ר וינדר הביע תקוותו כי התרופות, שכבר נמצאות בשימוש נרחב במניעת היווצרות קרישי דם בלב אצל חולים הסובלים מהפרעת קצב, ימצאו מקום מתאים גם בקרב חולים הסובלים מפקקת בוורידי הרגלים ומתסחיף בריאות.

"בחלק מהמקרים די בטיפול של חודשים ספורים, אך ישנם חולים שנזקקים לטיפול לשנים רבות. מתברר שרופאים רבים חוששים לתת טיפול מתמשך בתרופות כמו קומדין בעיקר בגלל פחד מדימום עקב התרופה. חשוב לציין